

Nipoxyme[®] Soluble 100

[Volver a la lista de productos](#)



 [Más información](#)

Nº Reg.: 1214 ESP

Especies de destino



Composición

Cada gramo contiene
Colistina sulfato 3.000.000 UI/g

Tiempo de espera

Carne: Terneros: 1 día.

Porcino: 1 día.

Aves de corral: 1 día.

Huevos: 0 días.

Indicaciones

Tratamiento y metafilaxis de las infecciones entéricas causadas por *E. coli* no invasiva sensible a la colistina. Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento metafiláctico.

Otra información

• Presentación

1 kg

• Forma farmacéutica

Polvo para administración en agua de bebida

• Dosificación

- **Terneros y porcino:** 100.000 UI de colistina por kilogramo de peso vivo al día durante 3-5 días consecutivos (equivalentes a 33,3 mg de medicamento/kg pv/ día durante 3-5 días). La dosis diaria recomendada debe dividirse en dos, si el medicamento se va a administrar directamente en la boca del animal.
- **Aves de corral:** 75.000 UI de colistina por kilogramo de peso vivo al día durante 3-5 días consecutivos (equivalentes a 25 mg del medicamento/kg p.v./día durante 3-5 días).

El consumo de agua medicada depende de las condiciones fisiológicas y clínicas de los animales y de la época del año. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración de colistina en el agua se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

• Contraindicaciones

- No administrar a animales con insuficiencia renal.
- No usar en caballos.

• Reacciones adversas

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o alguno de los excipientes.

No usar en caballos (especialmente en los potros) ya que la colistina, debido a una alteración del equilibrio de la microflora intestinal, podría provocar una colitis asociada al uso de antimicrobianos (Colitis X) normalmente relacionada con *Clostridium difficile*, que puede ser mortal.

• Precauciones de almacenamiento y período de validez

Conservar a temperatura inferior a 25 °C en un lugar seco y proteger de la luz.

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 18 meses.

Es recomendable el uso de la solución antes de las 12 horas para evitar pérdidas de actividad de la sustancia activa. Suprimir el agua de bebida a los animales antes de la toma del agua medicada.

Para mayor información, contáctese con nosotros

[Contacto](#)