

# Sintem<sup>®</sup> 800 mg/ml

[Volver a la lista de productos](#)



 [Más información](#)

**Nº Reg.: 2122 ESP**

## Especies de destino



## Composición

Cada gramo contiene:  
Ácido salicílico 690 mg – equivalente a salicilato de sodio 800 mg

## Tiempo de espera

**Terneros:** Carne: 0 días

**Porcino:** Carne: 0 días

## Indicaciones

### Terneros

- Para el tratamiento sintomático de la piroxia en enfermedades respiratorias agudas, en combinación con el tratamiento apropiado (antiinfeccioso) si es necesario.

### Porcino

- Para el tratamiento de la inflamación, en combinación con un tratamiento antibiótico simultáneo.

## Otra información

---

- **Presentación**

1 kg

5 kg

---

- **Forma farmacéutica**

Polvo para solución oral

---

- **Dosificación**

#### **Terneros:**

Vía oral, en el agua de bebida o la leche (sustitu-to), 40 mg de salicilato sódico por kg de peso vivo una vez al día (equivalentes a 50 mg de medicamento por kg de PV al día), durante de 1 a 3 días.

#### **Porcino:**

Vía oral, en el agua de bebida, 35 mg de salicilato sódico por kg de peso vivo al día (equivalentes a 43,75 mg de medicamento por kg de PV al día), durante de 3 a 5 días.

---

- **Contraindicaciones**

- Hipoproteinemia y afecciones hepáticas y renales
- Úlceras gastrointestinales y trastornos gastrointestinales crónicos;
- Disfunción del sistema hematopoyético, coagulopatías y diátesis hemorrágica
- Neonatos o terneros de menos de 2 semanas de edad;
- Lechones de menos de 4 semanas de edad;
- Hipersensibilidad al salicilato sódico o al excipiente.

---

- **Reacciones adversas**

Puede producirse irritación gastrointestinal, especialmente en animales con enfermedad gastrointestinal previa. Dicha irritación puede manifestarse clínicamente mediante la producción de estiércol negro debido a la pérdida de sangre en el tracto gastrointestinal. Puede producirse accidentalmente la inhibición de la coagulación sanguínea normal. Si esto ocurre, será reversible y los efectos disminuirán en 7 días aproximadamente.

---

- **Condiciones de conservación y período de validez**

No conservar a temperatura superior a 25 °C. No refrigerar o congelar. Proteger de la congelación.

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses.

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.



Período de validez después de su reconstitución en agua de bebida: 24 horas.

Período de validez después de su reconstitución en lactoreemplazante: 4 horas.

Para mayor información, póngase en contacto con nosotros

[Contacto](#)