

Trimsulfasol[®] 20/100 mg/ml

[Volver a la lista de productos](#)



 [Más información](#)

Nº Reg.: 3584 ESP

Especies de destino



Composición

Cada ml contiene:
Trimetoprima 20 mg
Sulfametoxazol 100 mg

Tiempo de espera

Porcino:

Carne: 8 días

Pollo:

Carne: 5 días.

Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

Indicaciones

Porcino (cerdos de engorde):

Tratamiento y metafilaxis de:

- Diarrea posdestete provocada por cepas de *Escherichia coli* β -hemolíticas positivas para K88 y K99 o 987P y sensibles a trimetoprima- sulfametoxazol;
- Infecciones bacterianas secundarias provocadas por cepas de *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus* spp. y *Haemophilus parasuis* sensibles a trimetoprima-sulfametoxazol.

Pollo (broiler):

Tratamiento y metafilaxis de:

- Colibacilosis causada por *Escherichia coli* sensibles a trimetoprima-sulfametoxazol;
- Coriza provocada por *Avibacterium paragallinarum* sensibles a trimetoprima-sulfametoxazol.

Otra información

- **Presentación**

5 L

- **Forma farmacéutica**

Solución para administración en agua de bebida

- **Dosificación**

Porcino (cerdos de engorde):

Administración por vía oral en agua de bebida

5 mg de trimetoprima y 25 mg de sulfametoxazol por kg de peso vivo al día (equivalentes a 1 ml de medicamento por 4,0 kg de PV al día), durante 4-7 días consecutivos.

Pollos (pollos de engorde):

Administración por vía oral en agua de bebida 7,5 mg de trimetoprima y 37,5 mg de sulfame-toxazol por kg de peso vivo al día (equivalentes a 1 ml de medicamento por 2,67 kg de PV al día), durante 3 días consecutivos.

- **Contraindicaciones**

- Hepatopatías o nefropatías, oliguria o anuria;
- Animales con trastornos del sistema hemato-poyético;
- Hipersensibilidad conocida a las sulfonamidas, a la trimetoprima o a algún excipiente.

- **Reacciones adversas**

Ocasionalmente puede ocurrir una reducción del consumo de agua en pollos. Podrían producirse reacciones de hipersensibilidad en raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados).

- Precauciones de almacenamiento y período de validez

No refrigerar o congelar. Proteger de la congelación.

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses.

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

Período de validez después de su reconstitución en agua de bebida: 24 horas.

Para mayor información, contáctese con nosotros

[Contacto](#)